



28 de noviembre de 2022

## Cuándo mantener a su niño en casa

Estimado padre/madre o tutor legal:

Mantenga a su niño en casa en los siguientes casos:

- Se encuentra muy enfermo para participar en las actividades normales.
- Necesita un nivel de atención u observación que la escuela o guardería no puede brindar.
- Crea un entorno poco saludable o seguro para los demás.

**Debe** mantener a su niño en casa si padece algunas afecciones. Estas incluyen, entre otras, las siguientes:

<b>Varicela</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que todas las ampollas tengan costra y no se formen ampollas nuevas.
<b>Diarrea</b>	Mantenga a su niño en casa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sin ir a la escuela hasta que pueda contener la diarrea y pueda participar en las actividades normales.</li> <li>• sin ir a la guardería hasta que haya tenido menos de tres episodios de diarrea durante las últimas 24 horas.</li> </ul>
<b>Fiebre</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que tenga una temperatura inferior a 38.0 °C (100.4 °F) y no tenga cambios de conducta, dolor de garganta, erupción cutánea, vómitos, diarrea, dolor de oído, irritabilidad o confusión.
<b>Gripe (influenza)</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que no tenga fiebre durante 24 horas.
<b>Impétigo</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que haya tomado antibióticos durante 24 horas.
<b>Staphylococcus aureus resistente a la metilina (SARM)</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que el drenaje pueda contenerse con un vendaje seco y limpio.
<b>Sarampión</b>	Mantenga a su niño en casa hasta cinco días después de que aparezca la erupción cutánea.
<b>Paperas</b>	Mantenga a su niño en casa hasta cinco días después de que comience la hinchazón.
<b>Tiña</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que se inicie el tratamiento.
<b>Escabiosis</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que finalice el tratamiento.
<b>Fiebre escarlata</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que haya tomado antibióticos durante 24 horas y no tenga fiebre.
<b>Herpes</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que la erupción cutánea pueda cubrirse o cuando todas las lesiones tengan costra.
<b>Infecciones de la piel</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que el drenaje pueda contenerse con un vendaje seco y limpio.
<b>Amigdalitis estreptocócica</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que haya tomado antibióticos durante 24 horas y no tenga fiebre.
<b>Vómitos</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que no haya vomitado durante 24 horas y pueda participar en actividades normales.
<b>Tos convulsa (tos ferina)</b>	Mantenga a su niño en casa hasta que haya tomado antibióticos durante un total de cinco días.
<b>Otras afecciones contagiosas</b>	Consulte con la escuela, la guardería o el proveedor de atención primaria de su niño, o llame al Departamento de Salud al (509) 249-6541.

**No** es necesario que mantenga a su niño en casa (a menos que esté muy enfermo para participar en las actividades normales) si padece las siguientes afecciones.

- |                          |   |                                      |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| • Bronquitis             | • Quinta enfermedad                     | • Lombriz intestinal                 |
| • Resfriado (sin fiebre) | • Exantema vírico de manos, pies y boca | • Neumonía                           |
| • Citomegalovirus (CMV)  | • Molusco contagioso                    | • Virus sincicial respiratorio (VSR) |
| • Infección de oído      | • Mononucleosis                         | • Verrugas                           |

El Departamento de Salud, los proveedores de atención primaria, las escuelas o las guarderías pueden hacer excepciones a estos requisitos de exclusión según el caso.